

**SVERNAMENTO DI MIGNATTINO PIOMBATO, *CHLIDONIAS HYBRIDUS*,
NEL BASSO GARDA VERONESE E REVISIONE DELLE SEGNALAZIONI
IN ITALIA DURANTE IL PERIODO INVERNALE**

ABSTRACT – Wintering of Whiskered Tern, Chlidonias hybridus, in Peschiera del Garda (Verona, Northern Italy) on Lake Garda and review of the winter records in Italy.

Dal 23 gennaio al 20 febbraio 2000 lungo la penisola di Sirmione (BS) fu segnalato lo svernamento di un mignattino, *Chlidonias niger* (GARGIONI & ROSSI, 2001), corretto successivamente in mignattino piombato in una *errata corrigé* della REDAZIONE DI AVOCETTA (2002). Lo stesso inverno, il 26 febbraio 2000, uno degli Autori (Sighele) osservò fugacemente una sterna nel vicino Porto Bergamini (Peschiera, VR), supponendo inizialmente che fosse un Fraticello, *Sterna albifrons*, in migrazione precoce, ma, per alcune valutazioni successive, ritenne poi che si trattasse di un mignattino piombato e che la prima identificazione fosse quindi errata. Per un refuso, notizia errata e successiva correzione sono state incluse entrambe in BON & SEMENZATO (2002).

La corretta segnalazione di Mignattino piombato in periodo invernale nel basso Garda fu resa pubblica solo l'anno successivo, quando il secondo degli Autori avvistò, il 4 febbraio 2001 a Fornaci di Peschiera (VR), un mignattino piombato in abito non riproduttivo. Non si conoscono altre osservazioni durante l'inverno 2000-2001.

L'inverno seguente il primo Autore osservò un mignattino piombato posato assieme ad alcuni individui di Gabbiano comune, *Larus ridibundus*, al porto di Peschiera, il 16 dicembre 2001 (BON & SEMENZATO, 2002). Dopo questa data un individuo di questa specie fu osservato numerose altre volte nel tratto di costa benacense tra i porti di Peschiera, Bergamini e Fornaci. L'ultima volta, quell'inverno, fu contattato il 24 febbraio 2002 (Sighele, oss. pers.).

Un mignattino piombato fu osservato, ancora a Porto Bergamini, il 28 novembre 2002 (M. D'Offria, com. pers.). Le osservazioni, sempre di un singolo individuo, si ripeterono poi durante tutto l'inverno, fino al 2 marzo 2003 (Sighele, oss. pers.). L'individuo è stato contattato con tutta probabilità fino a Pacengo, dove il 10 dicembre 2002 fu osservato un *Chlidonias* sp. (S. Pirola, com. pers.).

Un singolo individuo di Mignattino piombato ha quindi svernato sul tratto di Lago di Garda tra Pacengo e la penisola di Sirmione per almeno tre anni, dall'inverno 2000-2001 a quello 2002-2003, ma, verosimilmente, anche l'inverno precedente questo triennio (1999-2000).

È interessante rilevare, tra l'altro, che l'individuo è sempre stato osservato in completo piumaggio invernale, a differenza di quanto notato, invece, nel caso di svernamenti di Mignattino, in cui alcuni individui presentavano parziale o totale abito riproduttivo (BACCETTI, 1996; SERRA *et alii*, 1997).

Revisione delle segnalazioni invernali in Italia

Il Mignattino piombato in Italia è considerato migratore regolare, nidificante, e svernante irregolare (BRICHETTI & MASSA, 1998). Le segnalazioni invernali provengono in prevalenza dalla Sicilia orientale (Catanese e Siracusano), dove osservazioni di 1-3 individui sono abbastanza frequenti (regolari?) negli ultimi anni (IAPICHINO, 1993; CIACCIO & PRIOLO, 1997; CORSO *et alii*, 1999; BRICHETTI, 2001; O. Janni, *mailing list* EBN Italia 2001; BACCETTI *et alii*, 2002). La prima di cui siamo a conoscenza è quella di un individuo alla foce del Simeto

(CT) il 26 dicembre 1981 (CIACCIO & SIRACUSA, 1983). In Sardegna il Mignattino piombato è stato osservato durante il periodo invernale nel 1994 sia nello stagno di Molentargius (CA), sia in quello di Santa Giusta (OR), mentre nel 1995 due individui si sono fatti vedere ancora a Santa Giusta (BACCETTI *et alii*, 2002; M. Grussu, com. pers.). Per l'Italia continentale si conoscono tre segnalazioni invernali in Umbria: nel 1992-1993, con due individui sul Lago di Alviano (LAURENTI, 1995), e nei primi mesi del 1998 e del 2000, con l'osservazione di un individuo sul Lago Trasimeno (VELATTA & MUZZATTI, 2000; BACCETTI *et alii*, 2002). Recentemente il Mignattino piombato ha svernato almeno due volte anche in Emilia Romagna: 1-3 individui sono stati osservati alle Saline di Comacchio (FE) alla fine del 2000 (R. Tinarelli, com. pers.) e 4 individui nella vicina Valle Furlana (RA) il 12 gennaio 2001 (M. Azzolini, com. pers.). Nell'inverno 2002-2003 un individuo è stato osservato da ottobre a dicembre nel Modenese a Finale Emilia (GIANNELLA & TINARELLI, 2003) e, probabilmente lo stesso soggetto, nel vicino comune di Cento (FE) tra il 9 gennaio ed il 13 febbraio (A. Farioli, com. pers.). In precedenza un *Chlidonias* sp. are stato osservato alle Saline di Comacchio (FE) nel gennaio 1997 (R. Tinarelli, com. pers.).

Lo svernamento di questa specie è un evento nuovo per il Veneto (BON & SEMENZATO, 2002), ma le segnalazioni benacensi non sono le uniche in questa regione: un individuo, infatti, è stato osservato per qualche giorno nei pressi di Contarina (RO) dal 4 all'11 gennaio 2001 (E. Occhiato, *mailing list* EBN Italia 2001; BON & SCARTON, 2001; BON & SEMENZATO, 2002).

Lo svernamento del Mignattino piombato descritto nel presente articolo è il più settentrionale tra quelli noti, ed è forse quello che si è ripetuto con maggiore regolarità negli anni e nei luoghi. Poiché negli ultimi 11 anni questa specie è stata osservata in Italia tutti gli inverni, con un totale di individui variabile tra 1 e 9 (Tab. I), potrebbe essere considerata svernante regolare.

TABELLA I - Presenze invernali di Mignattino piombato, *Chlidonias hybridus*, in Italia (1992/1993 - 2002/2003)

TABLE I - Winter records of Whiskered Tern, *Chlidonias hybridus*, in Italy (1992/1993 - 2002/2003)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	tot. indd.
EMILIA R.					1 ^[B]				4 ^[A,B]		1 ^[B,F]	0-4
SARDEGNA		2 ^[D]	2 ^[D]									0-2
SICILIA			1 ^[B]	2 ^[A]	1 ^[A]	1 ^[A]	1 ^[A]		3 ^[B]	3 ^[C]	2 ^[C]	0-3
UMBRIA	2 ^[B]					1 ^[D,E]		1 ^[D,E]				0-2
VENETO								1 ^[B,E]	2 ^[A,D]	1 ^[B]	1 ^[B]	0-2
TOTALI	2	2	3	2	1 (2?)	2	1	2	9	4	4	1-9

Le cifre tra parentesi quadra si riferiscono alle fonti: i numeri corrispondono alle voci bibliografiche: 1 = BACCETTI *et alii*, 2002; 2 = BON & SEMENZATO, 2002; 3 = CIACCIO & PAIOLA, 1997; 4 = CORSO *et alii*, 1999; 5 = GIANNELLA & TINARELLI, 2003; 6 = LAURENTI, 1995; 7 = REDAZIONE DI AVOCETTA, 2002; 8 = VELATTA & MUZZATTI, 2001; [#] = l'individuo di Peschiera; [A] = M. Azzolini, com. pers.; [B] = R. Tinarelli, com. pers.; [C] = A. Corso, com. pers.; [D] = M. Grussu, com. pers.; [E] = mailing list EBN Italia; [F] = A. Farioli, com. pers.

BREVI NOTE

Ringraziamenti - Si ringraziano tutti gli appassionati che ci hanno reso note le loro osservazioni frugando nella loro memoria o nei loro taccuini: Maurizio Azzolini, Luca Bagni, Andrea Ciaccio, Alessio Farioli, Carlo Giannella, Marcello Grussu, Stefano Laurenti, Ernesto Occhiato, Menotti Passarella, Stefano Pirola, Alessandro Rossi, Luciano Ruggieri, Roberto Tinarelli, Emiliano Verza. Un ulteriore ringraziamento a Pierandrea Brichetti per la rilettura del testo.

BIBLIOGRAFIA

- BACCETTI N., 1996 - Mignattino *Chlidonias niger*. In: STIVAL E. (red.). Atlante degli uccelli svernanti in Provincia di Venezia - Inverni dal 1988/89 al 1993/94 - C.O.R.V.O., Montebelluna (TV), p. 123.
- BACCETTI N., DALL'ANTONIA P., MAGAGNOLI P., MELEGA L., SERRA L., SOLDATINI C. & ZENATELLO M., 2002 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000 - *Biol. Cons. Fauna*, 111: 1-240.
- BON M. & SCARTON F., 2001 - I censimenti degli uccelli acquatici svernanti nel Delta del Po (provincia di Rovigo): anni 1997-2001. In: BON M. & SCARTON F. (a cura di). Atti III Convegno Faunisti Veneti - *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, 51 (suppl.): 46-51.
- BON M. & SEMENZATO M. (red.), 2002 - Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001 - *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, 53: 231-258
- BRICHETTI P., 2001 - Mignattino piombato. In: SPAGNESI M. & SERRA L. (red.). Iconografia degli Uccelli d'Italia Vol. III - *INFS*, Ozzano Emilia.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1999 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997 - *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- CIACCIO A. & PRIOLO A., 1997 - Avifauna della foce del Simeto, del Lago di Lentini e delle zone umide adiacenti (Sicilia, Italia) - *Naturalista Sicil.*, (Ser. IV) 21: 309-413.
- CIACCIO A. & SIRACUSA M., 1983 - Interessanti osservazioni ornitologiche alla foce del Simeto (Catania, Sicilia) - *Riv. ital. Orn.*, 53: 37-40.
- CORSO A., CAPPELLO V. & CIACCIO A., 1999 - Dati preliminari sui Laridi e Sternidi svernanti in Sicilia orientale. In: SCARTON F., FRACASSO G. & BOGLIANI G. (a cura di). Atti X Convegno Italiano di Ornitologia - *Avocetta*, 23: 11.
- GARGIONI A. & ROSSI A., 2001 - Svernamento di Mignattino *Chlidonias niger* sul Lago di Garda (Lombardia). In: ARCAMONE E. & BRICHETTI P. (red.). Nuovi Avvistamenti - *Avocetta*, 25: 313.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R., 2003 - Resoconto ornitologico dell'Emilia Romagna, 2002 - *Picus*, 29: 9-18.
- IAPICHINO C. (red.), 1993 - Rapporto ornitologico Sicilia 1987-89 - *Naturalista Sicil.*, (Ser. IV) 17: 149-168.
- LAURENTI S., 1995 - Presenza invernale di Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*) al Lago di Alviano (Terni). In: PANDOLFI M. & FOSCHI U.F. (a cura di). Atti del VII Convegno Nazionale di Ornitologia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, 22: 651-652
- REDAZIONE DI AVOCETTA, 2002 - Errata Corrige - *Avocetta*, 26: 52
- SERRA L., MAGNANI A., DALL'ANTONIA P. & BACCETTI N., 1997 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995 - *Biol. Cons. Fauna*, 101: 1-312
- VELATTA F. & MUZZATTI M., 2001 - Osservazioni invernali di Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* nel Lago di Trasimeno (Umbria). In: ARCAMONE E. & BRICHETTI P. (red.). Nuovi Avvistamenti - *Avocetta*, 25: 313

MAURIZIO SIGHELE (*) & FAUSTA LUI (**)

(*) Via Lungolori, 5a - 37127 Verona
E-mail: maudoc@ebnitalia.it
(**) Via delle Rose, 30 - 41100 Modena
E-mail: fausta@unimore.it